

**Савезно такмичење за ученике основних школа**  
*6. разред*

1. Воз дужине 80 метара, крећући се брзином  $20m/s$ , наилази на мост дужине 200 метара. Дошавши до половине моста воз је застао и стајао 1 минут. Након тога се једну трећину преосталог времена, које му је било потребно да потпуно напусти мост, кретао брзином  $10m/s$ , другу  $54km/h$  а последњу трећину брзином  $72km/h$ . Колика је средња брзина воза у току прелажења моста? Колико времена ће се воз целом дужином налазити на мосту?
2. Густина непознате течности се у лабораторији може одредити помоћу мензуре (стаклена посуда облика ваљка са подеоцима) и ваге на следећи начин. Измери се на ваги маса празне мензуре  $m_1$ , затим се мензура напуни до неког подеока течности познате густине  $\rho$  и измери се маса напуњене мензуре  $m_2$ . Након тога мензура се до истог подеока напуни течности непознате густине  $\rho_x$  и измери маса мензуре са том течности  $m_3$ . Како гласи формула према којој, на овај начин, може да се одреди густина непознате течности?  
У једном таквом огледу су ученици за течност познате густине користили алкохол чија је густина  $\rho = 0,8g/cm^3$ . Алкохол су улили до неког подеока у мензуру и измерили да мензура напуњена њиме има масу  $0,4kg$ . Међутим, када је требало да сипају у мензуру течност непознате густине, грешком су сипали за десетину већу запремину те течности од употребљене запремине алкохола у претходном мерењу. Маса коју су при том измерили је 426 грама. За колико процената се густина коју су одредили користећи наведене (погрешне) податке и формулу изведену у првом делу задатка (за исте запремине непознате и познате течности) разликује од тачне вредности? Одредити тачну вредност густине непознате течности. Маса празне мензуре је 210 грама.
3. Хођајући по покретним степеницама од њиховог почетка до краја, путник први пут пређе 24 степеника, а други пут, крећући се на исту страну, али пет пута брже, 60 степеника. Колико би степеника прешао када би покретне степенице мировале?
4. Двојица ученика су се у лабораторији физике мало играла алкохолем и водом. У мензуру су улили  $10cm^3$  воде и одређену количину алкохола. Ниво усуте течности је био до подеока који је био означен бројем 100. Зачепили су мензуру и добро је промућкали тако да је густина смеше  $\rho_s = 956,5kg/m^3$ . Након тога су приметили да се ниво течности спустио на подеок који је показивао 92. Одредити запремину алкохола који су ученици употребили за прављење смеше. Густина алкохола је  $0,8g/cm^3$  а воде  $1g/cm^3$ .
5. Из Ниша за Београд крене аутобус Ниш-експреса (аутопревозничко предузеће из Ниша) брзином  $80km/h$ . Из Београда према Нишу, након времена од 30 минута, крене аутобус Ласте (аутопревозничко предузеће из Београда) њему у сусрет. Растојање између Београда и Ниша износи 230 километара. Ако је брзина другог аутобуса  $25m/s$ , после ког времена у односу на време поласка другог аутобуса ће растојање између њих бити 50 километара. Одредити времена кретања, рачуната од почетка кретања до сусрета, као и пређене путеве. Скицирати график сусрета.

Задатке припремио: др Љубиша Нешић

Рецензент: др Мирослав Николић

Председник комисије: др Надежда Новаковић

**Свим такмичарима желимо успешан рад**